

乳幼児の予防接種の対象者と接種時期

	ワクチン	対象期間	標準的な接種期間	接種間隔と接種回数
定期 予 防 接 種	・BCG	生後1歳に至るまでの間にある者	生後5か月に達した時から生後8か月に達するまで	1回
	・四種混合 (百日せき、ジフテリア破傷風、ポリオ)	生後2か月～90か月に至るまでの間にある者	初回：生後3か月に達した時から生後12か月に達するまで	20～56日までの間隔を置いて3回接種
			追加：初回3回終了後12か月に達した時から18か月に達するまで	1回
	・MR混合 (麻しん、風しん)	【第1期】 生後12か月～24か月に至るまでの間にある者	1才を過ぎたらできるだけ早い時期に接種	1回
		【第2期】 幼稚園・保育所等の年長児で小学校入学前の1年間（小学校入学1年前の4月1日から入学する年の3月31日まで）		1回
	・ヒブ(Hib) ワクチン	生後2か月～60か月に至るまでの間にある者	初回 生後2か月から7か月に至るまでの間で接種開始	27～56日(4～8週間)の間隔を置いて3回接種 ☆接種開始が生後7か月から12か月未満の場合は2回接種
			追加 初回接種終了後7か月～13か月まで	1回 ☆接種開始が生後12か月から60か月未満の場合は1回接種
	・小児用肺炎球菌 ワクチン	生後2か月～60か月に至るまでの間にある者	初回 生後2か月から7か月に至るまでの間で接種開始	27日以上の間隔を置いて3回接種 ☆接種開始が生後7か月から12か月未満の場合は2回接種 ※2回目、3回目は生後12か月を超えた場合は接種しない
			追加 生後12か月から15か月に至るまでの間	初回接種終了後60日以上の間隔を置いて1回接種 ☆初回接種が生後12か月から24か月未満の場合は60日以上の間隔を置いて2回接種 ☆初回接種が生後24か月から60か月未満の場合は1回接種
	・水痘	生後12か月～36か月に至るまでの間にある者	初回は生後12か月～15か月の間	1回目終了後3か月以上(6か月から12か月が標準)の間隔を置いて2回目を接種
	・日本脳炎	第1期 6～90か月未満	3歳～4歳に達するまでの期間	・初回免疫：6日以上28日までの間隔で2回接種
		第1期追加 6～90か月未満	4歳～5歳に達するまでの期間	・追加免疫：初回接種終了後6か月以上、標準的には1年を経過した時期に1回接種
第2期 9才～13歳未満		9歳～10歳に達するまでの期間	1回	
・B型肝炎	生後1歳に至るまでの間にある者	2か月～8か月に達する期間	生後2か月に1回目、生後3か月に2回目、生後7～8か月に3回目	
・ロタウイルス 1価(ロタリックス) 5価(ロタテック)	生後6～24週生後6～32週	1回目の接種は、生後14週6日までにを行うことを推奨	4週間以上の間隔で2回接種4週間以上の間隔で3回接種	
任意	・おたふくかぜ	1歳以上	1回目は1歳 2回目は5歳以上7歳未満(助成は小学入学前の3月31日までです)	