

乳幼児の予防接種の対象者と接種時期

【定期接種】

ワクチン	対象期間	標準的な接種期間	接種間隔と接種回数
・BCG	生後1歳に至るまでの間にある者	生後5か月に達した時から生後8か月に達するまで	1回
・四種混合 (百日せき、ジフテリア破傷風、ポリオ) ◎令和6年3月31日までに四種混合ワクチンを接種した方は、原則、同じワクチンで接種を完了することとされています。	生後2か月～90か月に至るまでの間にある者	初回 生後2か月に達した時から生後12か月に達するまで 追加 初回3回終了後12か月に達した時から18か月に達するまで	20～56日までの間隔をにおいて3回接種 1回
・四種混合 (百日せき、ジフテリア破傷風、ポリオ) ◎令和6年4月1日以降で1回目を接種される方は、「五種混合ワクチン」です。	生後2か月～90か月に至るまでの間にある者	初回 生後2か月以上7か月未満で接種開始 追加 初回3回終了後6～18か月までの間隔をにおいて接種	20～56日までの間隔をにおいて3回接種 1回
・MR混合 (麻しん、風しん)	【第1期】 生後12か月～24か月に至るまでの間にある者	1才を過ぎたらできるだけ早い時期に接種	1回
	【第2期】 幼稚園・保育所等の年長児で小学校入学前の1年間（小学校入学1年前の4月1日から入学する年の3月31日まで）		1回
・ヒブ(Hib)ワクチン ◎令和6年3月31日までに接種した方は、原則、同じワクチンで接種を完了することとされています。	生後2か月～60か月に至るまでの間にある者	初回 生後2か月から7か月に至るまでの間で接種開始 追加 初回接種終了後7か月～13か月まで	27～56日(4～8週間)の間隔をにおいて3回接種 ☆接種開始が生後7か月から12か月未満の場合は2回接種 1回 ☆接種開始が生後12か月から60か月未満の場合は1回接種
・小児用肺炎球菌ワクチン	生後2か月～60か月に至るまでの間にある者	初回 生後2か月から7か月に至るまでの間で接種開始 追加 生後12か月から15か月に至るまでの間	27日以上の間隔をにおいて3回接種 ☆接種開始が生後7か月から12か月未満の場合は2回接種 ※2回目、3回目は生後12か月を超えた場合は接種しない 初回接種終了後60日以上の間隔をにおいて1回接種 ☆初回接種が生後12か月から24か月未満の場合は60日以上の間隔をにおいて2回接種 ☆初回接種が生後24か月から60か月未満の場合は1回接種
・水痘	生後12か月～36か月に至るまでの間にある者	初回は生後12か月～15か月の間	1回目終了後3か月以上(6か月から12か月が標準)の間隔をにおいて2回目を接種
・日本脳炎	第1期 6～90か月未満	3歳～4歳に達するまでの期間	・初回免疫：6日以上28日までの間隔で2回接種 ・追加免疫：初回接種終了後6か月以上、標準的には1年を経過した時期に1回接種
	第1期追加 6～90か月未満	4歳～5歳に達するまでの期間	
	第2期 9才～13歳未満	9歳～10歳に達するまでの期間	1回
・B型肝炎	生後1歳に至るまでの間にある者	2か月～8か月に達する期間	生後2か月に1回目、生後3か月に2回目、生後7～8か月に3回目
・ロタウイルス 1価(ロタリックス) 5価(ロタテック)	生後6～24週 生後6～32週	1回目の接種は、生後14週6日までにを行うことを推奨	4週間以上の間隔で2回接種 4週間以上の間隔で3回接種

【任意接種】

・おたふくかぜ	1歳以上		1回目は1歳 2回目は5歳以上7歳未満(助成は小学入学前の3月31日までです)
---------	------	--	--