

# 0歳の予防接種スケジュール

# 生後2か月になったら、ワクチンを受けましょう

0歳の赤ちゃんをVPD（ワクチンで防げる病気）から守るためには、生後2か月になったらできるだけ早くワクチンを受けることが大切です。

| ワクチン名  | 誕生 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月      | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 1歳  |
|--|----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 生ワクチン<br>ロタウイルス<br>(注1)(注2)<br>定期無料                                      |    |     | ①   | ②   | ③<br>(※) |     |     |     |     |     |      |      |     |
| 不活化ワクチン<br>B型肝炎<br>定期無料  |    |     | ①   | ②   |          |     |     |     |     |     |      |      |     |
| 不活化ワクチン<br>小児用肺炎球菌<br>定期無料   |    |     | ①   | ②   | ③        |     |     |     |     |     |      |      | ④   |
| 不活化ワクチン<br>五種混合<br>(百日せき・シフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ混合)<br>定期無料                     |    |     | ①   | ②   | ③        |     |     |     |     |     |      |      | ④   |
| 不活化ワクチン<br>四種混合<br>(百日せき・シフテリア・破傷風・ポリオ)<br>※対象：令和6年3月31日までに接種した方<br>定期無料 |    |     | ①   | ②   | ③        |     |     |     |     |     |      |      | ④   |
| 不活化ワクチン<br>ヒブ<br>※対象：令和6年3月31日までに接種した方<br>定期無料                           |    |     | ①   | ②   | ③        |     |     |     |     |     |      |      | ④   |
| 生ワクチン<br>BCG<br>定期無料   |    |     |     |     |          |     |     | ①   |     |     |      |      |     |
| 生ワクチン<br>MR (麻しん風しん)<br>定期無料   |    |     |     |     |          |     |     |     |     |     |      |      | ①   |
| 生ワクチン<br>水痘 (水ぼうそう)<br>定期無料  |    |     |     |     |          |     |     |     |     |     |      |      | ① ② |
| 生ワクチン<br>おたふくかぜ<br>任意有料  |    |     |     |     |          |     |     |     |     |     |      |      | ①   |

(注2)ロタウイルスワクチンは2種類あります。  
 ロタリックス (1価ワクチン)  
 : 生後24週までに4週間隔で2回接種します。  
 ロタテック (5価ワクチン)  
 : 生後32週までに4週間隔で3回接種します。

定期予防接種の対象年齢

任意接種の接種できる年齢

同時接種

おすすめの接種時期 (数字は接種回数)

☆生ワクチン注射後、次に異なる種類の生ワクチン注射をする場合には、27日以上の間隔をあけて接種します。

同時に複数のワクチンを接種することができます。  
 くわしくはかかりつけ医にご相談ください。

※この資料は「VPDを知って、子どもを守ろう。」の会のホームページを参考に作成しました。